

## 5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FOLFOX IV) + Панитумумаб ХС588 + ХА080 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-2	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1, 15	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1, 15	Панитумумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500 мл	22 часа	внутривенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Кальция фолинат</b>																												
█	█																											
<b>Оксалиплатин</b>																												
█														█														
<b>Панитумумаб</b>																												
█														█														
<b>Флюороурацил</b>																												
█	█													█	█													
<b>Флюороурацил</b>																												
█	█													█	█													

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.

Панитумумаб >1000 мг растворяют в 150 мл 0,9% раствора NaCl и вводят в течение 90 минут.

В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

#### Литература:

Douillard J.Y. et al., J Clin Oncol 28: 4697ff, 2010.

