

Гидроксимочевина ХА149 (европейский протокол) Хроническая миелоидная лейкемия

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-30	Гидроксикарбамид	40 мг/кг	-	0	-	перорально
1-30	Гидроксикарбамид 2	40 мг/кг	-	30 шт	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Гидроксикарбамид																														
[График: 31 день]																														
Гидроксикарбамид 2																														
[График: 31 день]																														

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
31 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
постоянный прием**

Повторно: * Постоянный прием.

Примечание:

Корректировка дозы в зависимости от реакции.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016.

Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Nehlmann R. et al., Blood 84: 4064ff, 1994.

