

# FOLFIRINOX XC588 (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Иринотекан	180	0,9% NaCl	500 мл	90 минут	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Иринотекан																												

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

### Примечание:

**Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.**

**Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.**

**В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.**

**(\*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.**

**5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.**

### Литература:

**Conroy T. et al., N Engl J Med 364: 1817ff, 2011.**

