

Иматиниб (хроническая стадия) ХА149 (европейский протокол) Хроническая миелоидная лейкемия

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-30	Иматиниб	400 (const)	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Иматиниб																														
[График введения: 31 день]																														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
постоянный прием

Повторно: * Постоянный прием

Примечание:

В фазе акселерации ХМЛ начальная доза составляет 600 мг в сутки.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Druker B., N Engl J Med 344: 1031ff, 2001.

O'Brien S. et al., N Engl J Med 348: 994ff, 2003.

