

Гидроксимочевина ХА149 (европейский протокол) Хроническая миелоидная лейкемия

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1-30 | Гидроксикарбамид | 40 мг/кг | - | 0 | - | перорально |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Гидроксикарбамид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [График введения: 31 день] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
31 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
постоянный прием**

Повторно: * Постоянный прием.

Примечание:

Корректировка дозы в зависимости от реакции.

Обратите внимание!

• Гидроксикарбамид (Hydroxyurea). Капсулы.

Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 500 мг. Количество капсул в упаковке: 100 шт.

Литература:

Nehlmann R. et al., Blood 84: 4064ff, 1994.

