

## Анагрелид ХА149 (европейский протокол) Другие хронические миелопролиферативные заболевания

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1-30        | Анагрелид              | 4 x 0,5 (const)              | -            | 0               | -              | перорально    |

### График введения препаратов:

| 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Анагрелид |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
постоянный прием

#### Примечание:

\* Постоянный прием.

Начинают терапию с 0,5 мг/сутки в течение недели, затем дозу увеличивают еженедельно на 0,5 мг/сутки до достижения желаемого терапевтического эффекта. Общая предусмотренная доза в сутки распределяется на 2 раза (каждые 12 ч) или 3 раза (каждые 8 ч). Препарат с дозировкой, превышающей 5 мг/сутки не применяется.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Petitt R.M. et al., *Semin Hematol* 34: 51ff, 1997.

