

Анагрелид ХА149 (европейский протокол) Другие хронические миелопролиферативные заболевания

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1-30 | Анагрелид | 4 x 0,5 (const) | - | 0 | - | перорально |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Анагрелид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [График введения препаратов] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
постоянный прием

Примечание:

* Постоянный прием.

Начинают терапию с 0,5 мг/сутки в течение недели, затем дозу увеличивают еженедельно на 0,5 мг/сутки до достижения желаемого терапевтического эффекта. Общая предусмотренная доза в сутки распределяется на 2 раза (каждые 12 ч) или 3 раза (каждые 8 ч). Препарат с дозировкой, превышающей 5 мг/сутки не применяется.

Литература:

Petitt R.M. et al., Semin Hematol 34: 51ff, 1997.

