

# Руксолитиниб ХА149 (европейский протокол) Другие хронические миелопролиферативные заболевания

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-30	Руксолитиниб	2 x 15* (const)	-	0	-	перорально

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Руксолитиниб																															

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
постоянный прием

Повторно: \* Постоянный прием.

Примечание:

Начальная доза Руксолитиниба - по 15 мг, орально два раза в сутки пациентам с количеством тромбоцитов 100-200 г/л и по 20 мг два раза в сутки пациентам с количеством тромбоцитов >200 г/л.

Пациентам с количеством тромбоцитов 50-100 г/л прием начинают с 5 мг два раза в сутки.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Verstovsek S. et al., N Engl J Med 366: 799ff, 2012.

