

## Винорелбин (перорально) ХА149 (европейский протокол) - Часть 2 Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винорелбин	80	-	0	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Винорелбин</b>							

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
1

#### Примечание:

Назначение этой схемы возможно только после прохождения схемы - Винорелбин (перорально) ХА149 (европейский протокол) - Часть 1.

В случае нейтропении (один раз при 4 степени по ВОЗ или два раза при 3 степени по ВОЗ):

- В течение первых трех недель после начала лечения сохранять дозу 60 мг/м<sup>2</sup>/неделя.
- (\*) В течение следующих недель снижать дозу с 80 мг/м<sup>2</sup>/неделя до 60 мг/м<sup>2</sup>/неделя.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Jassem J. et al., Ann Oncol 12: 1375ff, 2001.

