

Пеметрексед ХС800 (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | Пеметрексед | 500 | 0,9% NaCl | 100 | 10 минут | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Пеметрексед | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

За 1-3 недели до начала терапии

Пеметрекседом:

- Замещение с использованием 350-1000 мкг фолиевой кислоты перорально каждые сутки до 3-х недель после завершения терапии.
- Замещение витамином В12: 1000 мкг в/м (раз в 9 недель) до 3 недель после завершения терапии.
- Оральный прием Дексаметазона - 8 мг перорально каждые сутки в течение 3 суток, начиная за 1 день до начала приема Пеметрекседа.

Литература:

Hanna N. et al., J Clin Oncol 22: 1589ff, 2004.

