

Цисплатин / Пеметрексед ХС326 (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Пеметрексед	500	0,9% NaCl	100	10 минут	внутривенно
1	Цисплатин	75	0,9% NaCl	1000	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Пеметрексед																					
Цисплатин																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

За 1-3 недели до начала терапии Пеметрекседом:

- Замещение с использованием 350-1000 мкг фолиевой кислоты перорально каждые сутки до 3-х недель после завершения терапии.

- Замещение витамином B12: 1000 мкг в/м (раз в 9 недель) до 3 недель после завершения терапии.

- Оральный прием Дексаметазона - 8 мг перорально каждые сутки в течение 3 суток, начиная за 1 день до начала приема Пеметрекседа.

Литература:

Scagliotti G.V. et al., J Clin Oncol 26: 3543ff, 2008.

