

## Нинтеданиб / Доцетаксел ХС412 (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1           | Доцетаксел             | 75                           | 0,9% NaCl    | 250        | 1 час          | внутривенно   |
| 2, 21       | Нинтеданиб             | 400 мг (const)               | -            | 0          | -              | перорально    |

### График введения препаратов:

| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Доцетаксел</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Нинтеданиб</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                   | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  |

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Нинтеданиб назначают по 200 мг два раза в сутки.

Могут быть пациенты, у которых была прекращена комбинированная терапия в связи с нежелательными явлениями.

#### Литература:

Reck M. et al., Lancet Oncol 15: 143ff, 2014.

