

# Нинтеданиб / Доцетаксел ХС412 (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
2, 21	Нинтеданиб	400 мг (const)	-	0	-	перорально

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Нинтеданиб</b>																					

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

### Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Нинтеданиб назначают по 200 мг два раза в сутки.

Могут быть пациенты, у которых была прекращена комбинированная терапия в связи с нежелательными явлениями.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

### Литература:

Reck M. et al., Lancet Oncol 15: 143ff, 2014.

