

Ниволумаб ХА149 (европейський протокол) Немелкоклеточний рак легкого - НМРЛ

| Дни терапії | Лекарственне средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | Ниволумаб | 3 мг/кг | 0,9% NaCl | 100 мл | 1 час | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ниволумаб | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Ниволумаб разводят до 1-10 мг/мл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Brahmer J. et al., N Engl J Med 373: 123ff, 2015.

