

## Оксалиплатин / Ралтитрексид ХС760 (европейский протокол) Мезотелиома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Оксалиплатин	130	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутривенно
1	Ралтитрексид	3	0,9% NaCl	100 мл	15 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Оксалиплатин</b>																					
<b>Ралтитрексид</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
4

#### Примечание:

Внимание! Оксалиплатин принимают через 1 час после Ралтитрекседа.

В случае нейротоксичности (2-й степени), длительность инфузии Оксалиплатина продлевают до 4-6 часов.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Fizazi K. et al., J Clin Oncol 18: 2293ff, 2000.

