

## FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 1 Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Флюороурацил	500	0,9% NaCl	100	20 минут	внутривенно
1	Циклофосфамид	500	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно
1	Эпирубицин	100	0,9% NaCl	250	30 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Флюороурацил</b>																					
<b>Циклофосфамид</b>																					
<b>Эпирубицин</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
3

#### Примечание:

**Внимание!** Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.  
Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

**Внимание!** В обязательном порядке показана - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 2.

