

FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 1 Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Флюороурацил	500	0,9% NaCl	100	20 минут	внутривенно
1	Циклофосфамид	500	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно
1	Эпирубицин	100	0,9% NaCl	250	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Флюороурацил																					
Циклофосфамид																					
Эпирубицин																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
3

Примечание:

Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе ≥ 1000 мг/м².
Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

Внимание! В обязательном порядке показана - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 2.

