ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) XC532 (FEC); XC416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 1 Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Флюороурацил	500	0,9% NaCl	100 мл	20 минут	внутривенно
1	Циклофосфамид	500	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1	Эпирубицин	100	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Флюороурацил																						
Циклофосфамид																						
Эпирубицин																						

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
3

Примечание:
Внимание! Эпирубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе ≥ 1000мг/м2.
Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).
Внимание! В обязательном порядке показана - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) XC532 (FEC); XC416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 2.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.