

FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 2 Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	100	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доцетаксел																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
3

Примечание:

Внимание! Данная схема действительна и применяется после схемы - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 1.

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Сопутствующая медикация:

Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Roche H. et al., J Clin Oncol 24: 5664ff, 2006.

