

Пертузумаб / Трастузумаб / Доцетаксел ХА082 + ХА110 + ХС416 (европейський протокол) Рак молочної залози

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно
1	Пертузумаб	420 мг (const)	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно
1	Трастузумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	500	90 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доцетаксел																					
Пертузумаб																					
Трастузумаб																					

Дополнительная информация

Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

(*) Фиксированная нагружающая доза" Трастузумаба - 8 мг/кг, со скоростью первого введения в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Трастузумаб можно также назначать подкожно в постоянной дозе 600 мг/5 мл.

(*) Фиксированная нагружающая доза" Пертузумаба - 840 мг, со скоростью первого введения в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Сопутствующая медикация:

Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Литература:

Baselga J. et al., N Engl J Med 366: 109ff, 2012; Swain S.M. et al., Lancet Oncol 14: 461ff, 2013; Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

