

Циклофосфамид / Липосомальный комплекс Доксорубицина цитрата ХС452 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Липосомный комплекс доксорубицина цитрата	60	0,9% NaCl	100	1 час	внутривенно
1	Циклофосфамид	600	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Липосомный комплекс доксорубицина цитрата																					
Циклофосфамид																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Липосомальный комплекс доксорубицина цитрата разводят до 0,4-1,2 мг/мл.

Месна: 20% дозы Циклофосфамида (если общая доза составляет >1000 мг) внутривенно или перорально за 2 часа до и через 2 и 6 часов, соответственно, после приема Циклофосфамида. Надлежащий диурез.

Литература:

Batist G. et al., J Clin Oncol 19: 1444ff, 2001.

