

# Пегилированный липосомальный Доксорубицин ХС452 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Пегилированный липосомальный доксорубицин	50	5% Глюкоза	500 мл	1 час	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Пегилированный липосомальный доксорубицин</b>																												

## Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

### Примечание:

Пегилированный липосомальный доксорубицин растворяют в 250 мл 5% раствора глюкозы, если общая доза ≤90 мг и в 500 мл 5% раствора глюкозы, если общая доза превышает 90 мг.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

### Литература:

O'Brien M.E., Ann Oncol 15: 440ff, 2004.

