

## Доцетаксел / Бевацизумаб ХС416 + ХА060 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100	90 минут	внутривенно
1	Доцетаксел	100	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Бевацизумаб</b>																					
<b>Доцетаксел</b>																					

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

(\*). Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

#### Литература:

Miles D., J Clin Oncol 28: 3239ff, 2010.

