

Доцетаксел / Карбоплатин / Трастузумаб ХА110 + ХС184 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250	1 час	внутривенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500	30 минут	внутривенно
1	Трастузумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	250	90 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доцетаксел																					
Карбоплатин																					
Трастузумаб																					

Дополнительная информация

Количество циклов: Адьювант Трастузумаба в течение 1 года;

Доцетаксел и Кабоплатин в течение 6 циклов.

Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

(* Фиксированная нагружающая доза" Трастузумаба - 8 мг/кг, со скоростью первого введения в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Трастузумаб можно также назначать подкожно в постоянной дозе 600 мг/5 мл.

Литература:

Slamon D. et al., N Engl J Med 365 (14): 1273ff, 2011;

Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

