

## Капецитабин / Доцетаксел ХС412 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1-14	Капецитабин	2500	-	0	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Капецитабин</b>																					

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

Капецитабин: 2500 мг/м<sup>2</sup> разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

O'Shaughnessy J. et al., J Clin Oncol 20: 2812ff, 2002.

