

Капецитабин / Лапатиниб ХА149 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-14	Капецитабин	2000	-	0	-	перорально
1-21	Лапатиниб	1250 (const)	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капецитабин																					
Лапатиниб																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Капецитабин, сутки 22.

Лапатиниб - длительный прием.

Капецитабин: 2000 мг/м² разделяют на 2 равные дозы - утреннюю и вечернюю, через 30 минут после приема пищи.

Обратите внимание!

- Капецитабин (Capecitabine). Капсулы. Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг.

Количество капсул в упаковке: 60 шт., 120 шт.

Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

- Лапатиниб (Lapatinib). Капсулы. Дозировки ЦПФ «Хемотека»: 250 мг. Количество капсул в упаковке: 28 шт., 35 шт., 42 шт., 70 шт. Возможно изготовление индивидуального количества капсул в упаковке.

Литература:

Geyer C.E. et al., N Engl J Med 355: 2733ff, 2006.

