

# Трастузумаб-Эмтанзин ХА112 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Трастузумаб - Эмтазин	3,6 мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Трастузумаб - Эмтазин</b>																					

## Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
12**

### Примечание:

Первое введение Трастузумаба-Эмтазина - в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Введение только с использованием встроенного фильтра.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

### Литература:

Verna S. et al., N Engl J Med 367: 1783ff, 2012.

