хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Трастузумаб-Эмтанзин XA112 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Трастузумаб - Эмтазин	3,6 мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Трастузумаб - Эмтазин																						

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
12

Примечание:
Первое введение Трастузумаба-Эмтазина - в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.
Введение только с использованием встроенного фильтра.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:
Verna S. et al., N Engl J Med 367: 1783ff, 2012.