

Трастузумаб-Эмтанзин ХА112 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Трастузумаб - Эмтазин	3,6 мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Трастузумаб - Эмтазин																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
12**

Примечание:

Первое введение Трастузумаба-Эмтазина - в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Введение только с использованием встроенного фильтра.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Verna S. et al., N Engl J Med 367: 1783ff, 2012.

