

Винорелбин (перорально) ХА149 (европейский протокол) - Часть 1 Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | Винорелбин | 60 | - | 0 | - | перорально |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Винорелбин | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
3

Примечание:

В случае нейтропении (один раз при 4 степени по ВОЗ или два раза при 3 степени по ВОЗ):

- В течение первых трех недель после начала лечения сохранять дозу 60 мг/м²/неделя.
- (*) В течение следующих недель снижать дозу с 80 мг/м²/неделя до 60 мг/м²/неделя. Смотрите - Винорелбин (перорально) ХА149 (европейский протокол) - Часть 2.

Литература:

Jassem J. et al., Ann Oncol 12: 1375ff, 2001.

