ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Гемцитабин (локальный протокол) Рак легких

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Гемцитабин	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Гемцитабин																													

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:
Повторно: * Первый цикл следует прекратить раньше в случае негематологической токсичности ≥ 2 степени или ≥ 3 степени гематологической токсичности; затем на 1, 8 и 15 сутки, с повтором на 29 сутки.
Повторно: через 28 суток.
Паспортная часть: нозология – рак легкого; код по мкб -10 – с 33, с 34.
Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.
Авторство: Национальный институт рака
Литература:
Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.