ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Карбоплатин / Этопозид (локальный протокол) Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
1, 3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Карбоплатин																													
	■																												
Этопозид																													
	■		■																										

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:
Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):
Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).
Если общая доза составляет ≥200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.
Паспортная часть: нозология – рак легкого; код по мкб -10 – с 33, с 34.
Потенциальные пользователи – отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.
Авторство: Национальный институт рака
Литература:
Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.