

Вазелінова олія для зовнішнього застосування (10 г - 100 г)

Склад

- 1 контейнер містить від 10 г до 100 г вазелінової олії

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування.

Інформація щодо застосування

(Відповідає Інструкції з медичного застосування Вазелінове масло, виробника ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна).

Фармакотерапевтична група

A06A A01 – проносні засоби.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Вазелін – очищена суміш твердих та рідких вуглеводів, які одержують із нафти. При прийомі внутрішньо, не всмоктуючись, розм'якшує калові маси та сприяє їхньому просуванню кишечником. При зовнішньому застосуванні усуває сухість шкіри, практично не абсорбується у системний кровотік.

Фармакокінетика

Фармакокінетика не визначалась.

Показання

Внутрішньо – хронічні запори у дорослих. Зовнішньо – перед застосуванням банок, при сухості шкіри (у тому числі навколо природних отворів), перед проведенням медичних процедур (змащувати наконечник клізми, газовивідної трубки).

Спосіб застосування та дози

Призначати дорослим внутрішньо по 1-2 столові ложки на добу. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально залежно від терапевтичного ефекту та переносимості препарату. Зовнішньо – дорослим і дітям змащувати шкіру тонким шаром, легко втираючи.

Діти.

Застосовувати дітям тільки зовнішньо.

Передозування

Не описане. Можливе посилення побічних ефектів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні

Тривале застосування може спричинити порушення процесу травлення, нудоту, анорексію, гіповітаміноз А, D, К, подразнення та свербіж у ділянці заднього проходу. Можливі алергічні реакції, включаючи гіперемію, свербіж шкіри.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату. Не можна застосовувати внутрішньо при гострих запальних процесах органів черевної порожнини (апендицит, перитоніт, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразковий коліт), геморої, у період менструації. Не застосовувати при отруєнні фосфором і фосфорорганічними сполуками. Не застосовувати

внутрішньо одночасно з жиророзчинними антигельмінтними засобами (натамол, вермокс, медамін, авермол).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Посилює побічні ефекти жиророзчинних та антигельмінтних засобів.

Особливості застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності препарат протипоказаний. У період годування груддю застосовувати з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для дитини, яке визначає лікар.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Дані відсутні.

Особливі заходи безпеки

Перед застосуванням збовтати. При необхідності після аплікації масло витерти ватним або марлевым тампоном і змити теплою водою з милом. Після припинення курсу застосування внутрішньо масло вазелінове може певний час виділятися із заднього проходу та забруднювати білизну, тому рекомендується використовувати прокладки.

Умови та термін зберігання

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності 30 діб.

Категорія відпуску

За рецептом лікаря (паперовим) або на вимогу лікувально-профілактичного закладу.

Систематизація повідомлень про побічні реакції та побічні дії лікарських засобів від замовників (СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015 п. 5.5.24)

У разі виявлення/отримання інформації про непередбачену побічну реакцію або відсутність ефективності лікарського засобу необхідно протягом 24 годин повідомити про це уповноважену особу ЦПФ «ХЕМОТЕКА» за телефоном +380504540690, завантажити/заповнити карту повідомлення і надіслати її на office@chemoteka.com.ua:

<https://docs.google.com/document/d/1da2Afm9Q3syJv-j1kQq7eHYq7KocpIqV/>