

Водню перексиду розчин 6% для зовнішнього застосування (200 мл - 5000 мл)

Склад

- 1000 мл препарату містить 200,0 мл водню перексиду 30 %

Допоміжні речовини:

- Вода очищена

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування.

Інформація щодо застосування

(Відповідає Інструкції по застосуванню Розчин перекису водню 6 %
<https://apteka911.ua/ua/shop/perekisi-vodoroda-r-r-6-but-400-ml-p40688>)

Фармакотерапевтична група

D08AX01 – антисептичні та дезінфікуючі засоби. Перекис водню.

Опис

Перекис водню 6% являє собою безбарвну прозору рідину без запаху, що містить 6% перекису водню в якості діючої речовини. Має антимікробну активність відносно бактерій, вірусів і грибів.

Переваги

Засіб активно проти мікробів, включаючи туберкульозні та особливо небезпечні – чуму, холеру, сапу, мелиоидоз, туляремію, сибірку.

Має протівірусну дію – ентеровіруси, поліомієліт, Коксакі, ЕСНО, ентеральні та парентеральні гепатити, ВІЛ, грип, ГРВІ, герпес, цитомегаловірус, аденовірус та т.п.

Знищує гриби-дерматофіти.

Робочі характеристики зберігаються після заморозки та відтавання.

Застосовується в:

- медичних установах
- загальноосвітніх закладах
- комунальних об'єктах
- виробництвах різного типу
- торгових комплексах

Використовується для профілактичної та поточної дезінфекції будь-яких поверхонь виробів з металу, гуми, пластику та скла, обладнання, приладів, інструментів, білизни тощо.

Способи застосування

Дезінфекція

Лабораторний посуд Санітарно-технічне обладнання Стоматологічні матеріали відбитки з альгінату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, артикулятори збиральний інвентар.

Предмети, вироби	Збудники	Режими застосування	Способи застосування
Білизна, забруднена виділеннями	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 120 хв	замочування
	Дерматофітон	3% - 40 хв	Замочування при 40°C
	Мікобактерії туберкульозу (тестовано на штамі Терра)	3% - 120 хв	Замочування при 40°C

	Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт	3% - 60 хв	Замочування при 40°C
Білизну, не забруднена виділеннями	сибірська виразка	3% - 60 хв	Замочування при 40°C
	Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт	3% - 30 хв	Замочування при 40°C
	Дерматофітон	3% - 30 хв	Замочування при 40°C
	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 30 хв	замочування
Жорстка меблі, Поверхні в приміщеннях	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 90 хв	протирання
	Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт	4% - 90 хв	протирання
	Чума, Холера, Туляремія, Сап, Меліоїдоз	3% - 60 хв	протирання
	Мікобактерії туберкульозу (тестовано на штамі Терра)	5% - 60 хв	протирання
		6% - 30 хв	протирання
	Дерматофітон	4% - 90 хв	протирання
	сибірська виразка	6% - 120 хв	протирання
Іграшки	Чума, Холера, Туляремія, Сап, Меліоїдоз	3% - 15 хв	Занурення, Протирання
	сибірська виразка	6% - 60 хв	Занурення, Протирання
	Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт	4% - 30 хв	Занурення, Протирання
	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 15 хв	Занурення, Протирання
ВМП з металів, гум на основі натурального і силіконового каучуку, скла, пластмас	Поліомієліт, ентеральним гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси	4% - 90 хв	занурення
		6% - 60 хв	занурення

	Мікобактерії туберкульозу (тестовано на штамі Терра)	6% - 240 хв	занурення	
	Дерматофітон	3% - 180 хв	занурення	
		4% - 120 хв	занурення	
		6% - 30 хв	занурення	
	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 180 хв	занурення	
		4% - 90 хв	занурення	
		6% - 60 хв	занурення	
	Лабораторний посуд	Дерматофітон	3% - 180 хв	занурення
			4% - 120 хв	занурення
5% - 60 хв			занурення	
сибірська виразка		6% - 60 хв	занурення	
Чума, Холера, Туляремія, Сап, Меліоїдоз		3% - 60 хв	занурення	
Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт		6% - 60 хв	занурення	
Мікобактерії туберкульозу (тестовано на штамі Терра)		6% - 240 хв	занурення	
Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії		3% - 60 хв	занурення	
Рукавички з каучуку, латексу, неопрена	Чума, Холера, Туляремія, Сап, Меліоїдоз	3% - 30 хв	занурення	
Поверхні приладів і апаратів	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 90 хв	протирання	
	Мікобактерії туберкульозу (тестовано на штамі Терра)	5% - 60 хв	протирання	
		6% - 30 хв	протирання	
	Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт	4% - 90 хв	протирання	
Посуд без залишків їжі	Чума, Холера, Туляремія, Сап, Меліоїдоз	3% - 120 хв	занурення	
	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 30 хв	занурення	
	сибірська виразка	6% - 60 хв	занурення	

	Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт	4% - 60 хв	занурення
Посуд з-під виділень	сибірська виразка	6% - 120 хв	занурення
Предмети догляду за хворими забруднені виділеннями	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	4% - 90 хв	Занурення, Протирання
Предмети догляду за хворими не забруднені виділеннями	Дерматофітон	3% - 180 хв	занурення
		4% - 120 хв	занурення
		5% - 60 хв	занурення
	Мікобактерії туберкульозу (тестовано на штамі Терра)	6% - 30 хв	занурення
	Поліомієліт, ентеральним гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси	4% - 90 хв	занурення
	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 60 хв	Занурення, Протирання
Санітарно-технічне обладнання	сибірська виразка	6% - 120 хв	протирання
	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 90 хв	протирання
	Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт	4% - 90 хв	протирання
	Мікобактерії туберкульозу (тестовано на штамі Терра)	5% - 90 хв	протирання
		6% - 30 хв	протирання
	Дерматофітон	4% - 90 хв	протирання
	Стоматологічні матеріали відбитки з альгілату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, артикулятори	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 15 хв
Поліомієліт, ентеральним гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси		4% - 15 хв	занурення
Прибиральний інвентар	Ентеральних гепатитів, парентерального гепатитів, герпесу, Пташиного грипу H5N1, ВІЛ, Свинячий грип H1N1, Коксакі, Аденовіруси, Грип, Збудники ГРВІ, ротавіруси, Поліомієліт	4% - 60 хв	замочування

	Грамнегативні бактерії, Грампозитивні бактерії	3% - 120 хв	замочування
--	--	-------------	-------------

Передстерилізаційне очищення

Предмети, вироби	Режими застосування	Способи застосування
ВМП з металів, гум на основі натурального і силіконового каучуку, скла, пластмас	0,5% - 15 хв	замочування
Інструменти до ендоскопів	0,5% - 15 хв	замочування

Стерилізація

Предмети, вироби	режими застосування	способи застосування
ВМП з металів, гум на основі натурального і силіконового каучуку, скла, пластмас	6% - 6 хв	занурення
Обладнання для стоматологічних кабінетів	6% - 6 хв	занурення
Інструменти хірургічні	6% - 6 хв	занурення

Умови та термін зберігання

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі нижче 15 °С.

Термін придатності 30 діб.

Категорія відпуску

За рецептом лікаря (паперовим) або на вимогу лікувально-профілактичного закладу.

Систематизація повідомлень про побічні реакції та побічні дії лікарських засобів від замовників (СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015 п. 5.5.24)

У разі виявлення/отримання інформації про непередбачену побічну реакцію або відсутність ефективності лікарського засобу необхідно протягом 24 годин повідомити про це уповноважену особу ЦПФ «ХЕМОТЕКА» за телефоном +380504540690, завантажити/заповнити карту повідомлення і надіслати її на office@chemoteka.com.ua:

<https://docs.google.com/document/d/1da2Afm9Q3syJv-j1kQq7eHYq7KocpIqV/>