

# Водню пероксиду розчин 3% стабілізований по 200, 400 мл у флаконах полімерних та по 5000 мл у каністрах полімерних

## Склад

- 1 мл препарату містить 100 мг водню пероксиду 30 %

Допоміжні речовини:

- Натрію бензоат
- Вода очищена

## Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування.

## Інформація щодо застосування

*(Витяг з Державного формуляру лікарських засобів, затвердженого Наказом міністерства охорони здоров'я України 12.03.2024 № 418).*

## Фармакотерапевтична група

D08AX01 – антисептичні та дезінфікуючі засоби.

## Основна фармакотерапевтична дія

При контакті р-ну перекису водню з uszkodженою шкірою та слизовими оболонками вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній); при застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості м/о; препарат має кровоспинний ефект.

## Показання

Для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому uszkodженні тканин БНФ, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

## Спосіб застосування та дози

Р-н наносять на uszkodжену ділянку шкіри для дезінфекції ран *per se* (без розведення); для полоскання розчинити 1 стол. л. в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим р-ном перекису водню; тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

Визначена добова доза (DDD): зовнішньо – не визначено.

## Побічна дія та ускладнення при застосуванні

Відчуття печіння в момент обробки рани; місцеві АР; гіпертрофія сосочків язика.

## Протипоказання

Гіперчутливість до препарату.

## Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Невідома.

## Особливості застосування

*Особливості застосування у жінок в період вагітності та в період лактації.*

Можна застосовувати.

*Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції печінки.*

Можна застосовувати.

*Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції нирок.*

Спеціальних рекомендацій немає.

*Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції серцево-судинної системи.*

Спеціальних рекомендацій немає.

*Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції дихальної системи.*

Спеціальних рекомендацій немає.

*Особливості застосування і обмеження у дітей.*

У дітей – застосовують.

*Особливості застосування і обмеження у осіб похилого та старечого віку.*

У осіб похилого та старечого віку – спеціальних рекомендацій немає.

### **Умови та термін зберігання**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі нижче 15 °С.

Термін придатності 2 роки.

### **Категорія відпуску**

За рецептом лікаря (паперовим) або на вимогу лікувально-профілактичного закладу.

### **Фармацевтична опіка**

*Фармацевтична опіка, скерована на лікарів та медичний персонал.*

Нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів деяких оксидантів, а також в освітленому та теплому місці. З обережністю застосовувати для обробки глибоких ран та зрошення порожнин, враховуючи можливість емболій.

*Фармацевтична опіка, скерована на пацієнтів.*

Уникати попадання р-ну в очі.

### **Систематизація повідомлень про побічні реакції та побічні дії лікарських засобів від замовників (СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015 п. 5.5.24)**

У разі виявлення/отримання інформації про непередбачену побічну реакцію або відсутність ефективності лікарського засобу необхідно протягом 24 годин повідомити про це уповноважену особу ЦПФ «ХЕМОТЕКА» за телефоном +380504540690, завантажити/заповнити карту повідомлення і надіслати її на [office@chemoteka.com.ua](mailto:office@chemoteka.com.ua):

<https://docs.google.com/document/d/1da2Afm9Q3syJv-j1kQq7eHYq7KocpIqV/>