

## Гліцерину розчин 10% для зовнішнього застосування (20 мл – 200 мл)

### Склад

- 1 мл препарату містить 100,0 мг гліцерину

Допоміжні речовини:

- Фармасал-натрію хлорид
- Вода для ін'єкцій

### Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування.

### Інформація щодо застосування

*(Витяг з Державного формуляру лікарських засобів, затвердженого Наказом міністерства охорони здоров'я України 12.03.2024 № 418).*

### Фармакотерапевтична група

D02AX – засоби з пом'якшувальною та захисною дією.

### Основна фармакотерапевтична дія

Виявляє пом'якшувальну дію на шкіру; застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну; майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

### Показання

Пом'якшення шкіри та обробка слизових оболонок; як основа для виготовлення лініментів та мазей.

### Спосіб застосування та дози

Зовнішньо обробляти шкіру та слизові оболонки, робити аплікації 30% р-ном на суху шкіру (розводити водою у співвідношенні 1:3).

Визначена добова доза: зовнішньо – не визначено.

### Побічна дія та ускладнення при застосуванні

Не виявлені.

### Протипоказання

Гіперчутливість до препарату; наявність пошкоджень на шкірі (тріщини, відкриті рани).

### Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Невідома.

### Особливості застосування

*Особливості застосування у жінок в період вагітності та в період лактації.*

Дані відсутні.

*Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції печінки.*

Спеціальних рекомендацій немає.

*Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції нирок.*

Спеціальних рекомендацій немає.

*Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції серцево-судинної системи.*

Спеціальних рекомендацій немає.

*Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції дихальної системи.*

Спеціальних рекомендацій немає.

*Особливості застосування і обмеження у дітей.*

У дітей – дані відсутні.

*Особливості застосування і обмеження у осіб похилого та старечого віку.*

У осіб похилого та старечого віку – спеціальних рекомендацій немає.

### Умови та термін зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності 30 діб.

### **Категорія відпуску**

За рецептом лікаря (паперовим) або на вимогу лікувально-профілактичного закладу.

### **Фармацевтична опіка**

*Фармацевтична опіка, скерована на лікарів та медичний персонал.*

Гліцерин майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки. Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

*Фармацевтична опіка, скерована на пацієнтів.*

Запобігати попаданню в очі.

### **Систематизація повідомлень про побічні реакції та побічні дії лікарських засобів від замовників (СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015 п. 5.5.24)**

У разі виявлення/отримання інформації про непередбачену побічну реакцію або відсутність ефективності лікарського засобу необхідно протягом 24 годин повідомити про це уповноважену особу ЦПФ «ХЕМОТЕКА» за телефоном +380504540690, завантажити/заповнити карту повідомлення і надіслати її на [office@chemoteka.com.ua](mailto:office@chemoteka.com.ua):

<https://docs.google.com/document/d/1da2Afm9Q3syJv-j1kQq7eHYq7KocpIqV/>