

Йоду розчин спиртовий 5% (1 мл - 100 мл)

Склад

- 1 мл препарату містить 50,0 мг йоду та 20,0 мг калію йодиду.

Допоміжні речовини:

- Етанол 96 %
- Вода очищена

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування.

Інформація щодо застосування

(Витяг з Державного формуляру лікарських засобів, затвердженого Наказом міністерства охорони здоров'я України 12.03.2024 № 418).

Фармакотерапевтична група

D08AG03 – антисептичні та дезінфекційні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія

Препарат містить елементарний йод, для якого характерні протимікробна, місцевопідразнювальна та відволікаюча дії. при нанесенні на шкіру і слизові оболонки препарат зумовлює подразнювальну дію і може спричинити рефлекторні зміни в діяльності організму, проникаючи, йод активно впливає на обмін речовин, посилює процеси дисиміляції.

Показання

Зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах, невралгіях (чинить відволікаючу дію).

Спосіб застосування та дози

При зовнішньому застосуванні йодом змочують ватний тампон, який використовують для обробки уражених ділянок шкіри.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні

Нежить, кропив'янка, слино- та сльозовиділення, висипи на шкірі, контактний дерматит, набряк Квінке.

Протипоказання

Гіперчутливість до йоду; діабетичні, трофічні виразки.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Аміак – несумісність.

Брильянтовий зелений – несумісність.

Дезінфікуючі ЛЗ, що містять ферменти, ртуть, луги, відновники – несумісність.

Ефірні масла – несумісність.

ЛЗ для зовнішнього застосування, що містять органічні сполуки – денатурація білкових компонентів.

Особливості застосування

Особливості застосування у жінок в період вагітності та в період лактації.

Не рекомендується через можливий ризик розвитку порушень ф-ції щитовидної залози у плода/дитини.

Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції печінки.

Спеціальних рекомендацій немає.

Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції нирок.

Спеціальних рекомендацій немає.

Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції серцево-судинної системи.

Спеціальних рекомендацій немає.

Особливості застосування ЛЗ при порушенні функції дихальної системи.

Спеціальних рекомендацій немає.

Особливості застосування і обмеження у дітей.

У дітей – не застосовувати у новонароджених через можливий ризик розвитку порушень ф-ції щитовидної залози та уражень шкіри.

Особливості застосування і обмеження у осіб похилого та старечого віку.

У осіб похилого та старечого віку – спеціальних рекомендацій немає.

Умови та термін зберігання

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності 180 діб.

Категорія відпуску

За рецептом лікаря (паперовим) або на вимогу лікувально-профілактичного закладу.

Фармацевтична опіка

Фармацевтична опіка, скерована на лікарів та медичний персонал.

Не застосовувати (р-н спиртовий 5 %) на слизові оболонки, оскільки спирт може викликати опіки, сильне подразнення. Не застосовувати на великих ділянках шкіри ч/з можливий розвиток опіку.

Обережно у пацієнтів зі світлим волоссям.

Фармацевтична опіка, скерована на пацієнтів.

Не допускати потрапляння в очі.

Систематизація повідомлень про побічні реакції та побічні дії лікарських засобів від замовників (СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015 п. 5.5.24)

У разі виявлення/отримання інформації про непередбачену побічну реакцію або відсутність ефективності лікарського засобу необхідно протягом 24 годин повідомити про це уповноважену особу ЦПФ «ХЕМОТЕКА» за телефоном +380504540690, завантажити/заповнити карту повідомлення і надіслати її на office@chemoteka.com.ua:

<https://docs.google.com/document/d/1da2Afm9Q3syJv-j1kQq7eHYq7KocpIqV/>