

## **Ксероформ, порошок для наскірного застосування (1 г - 10 г)**

### **Склад**

- 1 контейнер містить вісмуту трибромфеноляту від 1 г до 10 г.

### **Лікарська форма**

Порошок для наскірного застосування.

### **Інформація щодо застосування**

*(Відповідає Інструкції для медичного застосування Ксероформ, виробника ТОВ "Исток-Плюс", м. Запоріжжя, Україна).*

### **Фармакотерапевтична група**

D08AX – антисептичні та дезінфікуючі засоби. Інші антисептики та дезінфектанти.

### **Основна фармакотерапевтична дія**

Вісмуту трибромфенолят (ксероформ) має антисептичні, в'язучі та підсушуючі властивості. Дія препарату полягає у взаємодії з білками тканин з утворенням альбумінатів, які подібно захисній плівці оберігають чутливі нервові закінчення від подразнення, а також у звуженні судин, зменшенні їх проникності (зменшується ексудація) і інгібуванні ферментів; взаємодія з білками мікроорганізмів пригнічує їхню життєдіяльність.

### **Показання**

Як в'язучий, підсушуючий та антисептичний засіб при запальних захворюваннях шкіри.

### **Спосіб застосування та дози**

Застосовують зовнішньо, порошок наносять на уражені ділянки шкіри. Термін лікування залежить від перебігу захворювання та встановлюється лікарем індивідуально.

### **Передозування**

Дані відсутні.

### **Побічна дія та ускладнення при застосуванні**

Не відзначалося.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій лікування слід припинити та проконсультуватися з лікарем.

### **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

Не встановлена.

### **Особливості застосування**

*Застосування в період вагітності або годування груддю.*

Немає даних щодо застосування у період вагітності або годування груддю, тому препарат слід призначати тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами*

Не впливає.

*Діти*

Ефективність і безпека при застосуванні препарату дітям не встановлені. З цієї причини його застосування можливе тільки під наглядом та за призначенням лікаря.

### **Умови та термін зберігання**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності 15 діб.

**Категорія відпуску**

За рецептом лікаря (паперовим) або на вимогу лікувально-профілактичного закладу.

**Систематизація повідомлень про побічні реакції та побічні дії лікарських засобів від замовників (СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015 п. 5.5.24)**

У разі виявлення/отримання інформації про непередбачену побічну реакцію або відсутність ефективності лікарського засобу необхідно протягом 24 годин повідомити про це уповноважену особу ЦПФ «ХЕМОТЕКА» за телефоном +380504540690, завантажити/заповнити карту повідомлення і надіслати її на [office@chemoteka.com.ua](mailto:office@chemoteka.com.ua):

<https://docs.google.com/document/d/1da2Afm9Q3syJv-j1kQq7eHYq7KocplqV/>