

## 5FU / Цисплатин ХС284 (європейський протокол) Рак стравоходу

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1-5	Флюороурацил	1000	0,9% NaCl	1000	24 години	внутрішньовенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	500	2 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Флюороурацил</b>																												
<b>Цисплатин</b>																												

### Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**

#### Примітка:

**Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):**

#### Супутня медикація:

**Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.**

**200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.**

**Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.**

#### Література:

(\* Bleiberg H. et al., Eur J Cancer 33: 1216ff, 1997),  
Kelsen D.P. et al., N Engl J Med 339: 1979ff, 1998.

