

## ЕОХ ХС490 (європейський протокол) Рак шлунку

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-21	Капецитабін	1250	-	0	-	перорально
1	Оксаліплатин	130	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутрішньовенно
1	Епірубіцин	50	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Капецитабін</b>																					
<b>Оксаліплатин</b>																					
<b>Епірубіцин</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

**Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.**

**Капецитабін: 1250 мг/м<sup>2</sup> розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.**

**Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).**

**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**

#### Література:

**Cunningham D. et al., N Engl J Med 358: 36ff, 2008.**

