

5FU / Лейковорин / Оксаліплатин (FLO) ХС752 (європейський протокол) Рак шлунку

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутрішньовенно
1	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутрішньовенно
1	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кальцію фолінат														
Оксаліплатин														
Флюороурацил														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
12

Примітка:

Кількість циклів: протягом перебігу захворювання.
(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Al-Batran S.E. et al., J Clin Oncol 26: 1435ff, 2008.

