

5FU / Лейковорин / Оксаліплатин (FLO) ХС752 (європейський протокол) Рак шлунку

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | Кальцію фолінат | 200 | 0,9% NaCl | 250 мл | 2 години | внутрішньовенно |
| 1 | Оксаліплатин | 85 | 5% Глюкоза | 500 мл | 2 години | внутрішньовенно |
| 1 | Флюороурацил | 2600 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 24 години | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Кальцію фолінат | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Оксаліплатин | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
12

Примітка:

Кількість циклів: протягом перебігу захворювання.
(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Al-Batran S.E. et al., J Clin Oncol 26: 1435ff, 2008.

