

Паклітаксел / Рамуцирумаб ХА149 (європейський протокол) Рак шлунку

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 8, 15 | Паклітаксел | 80 | 0,9% NaCl | 250 мл | 1 година | внутрішньовенно |
| 1, 15 | Рамуцирумаб | 8 мг/кг | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 година | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Паклітаксел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | | | | | | | █ | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| Рамуцирумаб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну. Рамуцирумаб також можна застосовувати в монотерапії.

Пацитаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.

Супутня медикація до Паклітакселю:

Дексаметазон, 20 мг внутрішньовенно за 30 хвилин до Паклітакселю або Дексаметазону - 20 мг орально за 6 та 12 годин до Паклітакселю. Рекомендована додаткова премедикація 50 мг Ранітину та 30 мг Дифенгідраміну.

Розведені розчини Паклітакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Wilke H.J. et al., *Lancet Oncol* 15: 1224ff, 2014; Fuchs C.S. et al., *Lancet* 383: 31ff, 2014.

