

## Паклітаксел / Рамуцирумаб ХА149 (європейський протокол) Рак шлунку

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Паклітаксел	80	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1, 15	Рамуцирумаб	8 мг/кг	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Паклітаксел</b>																												
█							█							█														
<b>Рамуцирумаб</b>																												
█														█														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну. Рамуцирумаб також можна застосовувати в монотерапії.

Пацитаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.

Супутня медикація до Паклітакселю:

Дексаметазон, 20 мг внутрішньовенно за 30 хвилин до Паклітакселю або Дексаметазону - 20 мг орально за 6 та 12 годин до Паклітакселю. Рекомендована додаткова премедикація 50 мг Ранітину та 30 мг Дифенгідраміну.

Розведені розчини Паклітакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Wilke H.J. et al., *Lancet Oncol* 15: 1224ff, 2014; Fuchs C.S. et al., *Lancet* 383: 31ff, 2014.

