

## Гемцитабін ХС592 (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22, 29, 35, 43	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Гемцитабін																															

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
50 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Перший цикл слід припинити раніше у разі негематологічної токсичності  $\geq 2$  ступеня або  $\geq 3$  ступеня гематологічної токсичності; потім на 1, 8 та 15 добу, з повтором на 29 добу. Кількість циклів: 6 (1 цикл - 7 тижнів).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Burris H.A. et al., J Clin Oncol 15: 2403ff, 1997.

