ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Гемцитабін XC592 (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22, 29, 35, 43	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Гемцитабін																															

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
Перший цикл слід припинити раніше у разі негематологічної токсичності ≥ 2 ступеня або ≥ 3 ступеня гематологічної токсичності;
потім на 1, 8 та 15 добу, з повтором на 29 добу.
Кількість циклів: 6 (1 цикл - 7 тижнів).
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Burris H.A. et al., J Clin Oncol 15: 2403ff, 1997.