

НАВ-паклітаксел / Гемцитабін ХС595 (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	НАВ-паклітаксел	125	-	0	30 хвилин	внутрішньовенно
1, 8, 15	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
НАВ-паклітаксел																												
█							█							█														
Гемцитабін																												
█							█							█														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Von Hoff D.D. et al., N Engl J Med 369: 1691ff, 2013.

