

НАВ-паклітаксел / Гемцитабін ХС595 (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 8, 15 | НАВ-паклітаксел | 125 | - | 0 | 30 хвилин | внутрішньовенно |
| 1, 8, 15 | Гемцитабін | 1000 | 0,9% NaCl | 250 мл | 30 хвилин | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| НАВ-паклітаксел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Гемцитабін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Von Hoff D.D. et al., N Engl J Med 369: 1691ff, 2013.

