ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Гемцитабін / Ерлотиніб XC592 (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м$^2$ | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 8, 15 | Гемцитабін | 1000 | 0,9% NaCl | 250 мл | 30 хвилин | внутрішньовенно |
| 1-28 | Ерлотиніб | 100 (const) | - | 0 | - | перорально |

**Графік введення препаратів:**




## Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:**
**29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:**
**2**

**Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).**
**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**
**Література:**

**Moore M.J., J Clin Oncol 25: 1960ff, 2007.**