

## Гемцитабін / Ерлотиніб ХС592 (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-28	Ерлотиніб	100 (const)	-	0	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Гемцитабін</b>																												
<b>Ерлотиніб</b>																												

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)  
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Moore M.J., J Clin Oncol 25: 1960ff, 2007.

